

*Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.*

## **Stesolid® rectiole**

### **Samenstelling:**

Werkzame bestanddeel: diazepam 2mg/ml en 4mg/ml.

Bevat de volgende hulpstoffen: benzoëzuur, ethanol, propyleenglycol, natriumbenzoaat, benzylalcohol, gezuiverd water.

### **Eigenschappen:**

Diazepam behoort tot de benzodiazepines. Het remt bepaalde prikkels af in de hersenen, zodat gevoelens van angst, spanning en rusteloosheid afnemen. Diazepam werkt ook spierontspannend en gaat daardoor spierspasmen tegen.

### **Doeldieren:**

Er is ervaring met het gebruik van diazepam bij de hond en de kat.

### **Indicaties:**

Diazepam rectioles worden toegepast in geval van hevige spierverkrampingen, zoals bij lang aanhoudende epileptische aanvallen (status epilepticus). Het wordt alleen in acute gevallen gebruikt en wanneer toedienen van een geneesmiddel via de bek niet mogelijk is.

### **Waarschuwingen en contra-indicaties:**

Stesolid niet gebruiken bij Myasthenia gravis (ziekte die gekenmerkt wordt door spierzwakte) of overgevoeligheid voor benzodiazepines.

Er zijn sterke aanwijzingen voor schadelijkheid voor de jongen tijdens de dracht. Ook gaat diazepam over in de moedermelk. Het gebruik tijdens dracht en lactatie wordt daarom afgeraden.

### **Toediening / Dosering:**

Stesolid rectioles toedienen indien de epileptische aanval enkele minuten aanhoudt.

De gebruikelijke dosering voor honden is 0,5 - 2 mg per kg lichaamsgewicht tot het effect optreedt (de spierkrampen verdwijnen).

Bij onvoldoende effect kan bij de hond na 10 minuten nogmaals dezelfde dosering worden gegeven.

Deze dosering kan maximaal 3x worden herhaald.

De gebruikelijke dosering voor katten is 0,5 - 1 mg per kg lichaamsgewicht tot het effect optreedt (de spierkrampen verdwijnen).

Stesolid® dient via de anus te worden toegediend.

### **Bijwerkingen:**

De meest voorkomende bijwerkingen zijn sufheid, verminderde ademhaling, spierzwakte en maag- of darmklachten (diarree of verstopping). Soms kan een tegengestelde reactie optreden, waardoor geen sufheid optreedt, maar hyperactiviteit en soms geïrriteerdheid. Dit komt vooral voor bij katten.

### **Interacties met andere geneesmiddelen:**

Wanneer diazepam samen met andere geneesmiddelen wordt gebruikt, kunnen ongewenste effecten optreden. Dit zal in de meeste gevallen nauwelijks een rol spelen, omdat diazepam rectioles alleen in noodgevallen worden gebruikt. Echter, wanneer al langere tijd fenytoïne of fenobarbital wordt gegeven, kan de werkzaamheid van diazepam minder zijn. Licht de dierenarts in ieder geval altijd in over andere geneesmiddelen die uw hond of kat gebruikt.

### **Fabrikant:**

De registratiehouder is Actavis BV te Baarn, registratienummers: RVG 07606 en 07607.

### **Bewaarcondities:**

De rectioles zijn houdbaar tot de datum die op het etiket is vermeld.

Buiten bereik van kinderen op een droge plek bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaren.

Breng restanten van de geneesmiddelen, die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.

---

*Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden.*

*Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.*