

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Neotriam oorzalf

Farmaceutische vorm:

Oorzalf

Samenstelling:

Werkzame bestanddelen:

Neomycine sulfaat 3,5mg/g en Triamcinolonacetonide 1,0mg/g.

Bevat de volgende hulpstoffen: witte vaseline, paraffine vloeibaar 110-230 mPa.s.

Eigenschappen:

Neomycine is een antibioticum en behoort tot de groep aminoglycosiden. Het is werkzaam tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën. Triamcinolonacetonide is een corticosteroïd en werkt ontstekingsremmend. Het vermindert roodheid, zwellingen en jeuk.

Doeldieren:

Er is ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij de hond en (in beperkte mate) in de kat.

Indicaties:

Neotriam oorzalf wordt toegepast voor de behandeling van ontstekingen van de uitwendige gehoorgang (otitis externa) die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor neomycine.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Deze oorzalf is bedoeld voor gebruik in de buitenste gehoorgang. Geen enkel oorpreparaat is geschikt voor gebruik in het middenoor. Als er sprake is van een geperforeerd trommelvlies en lokale behandeling van de buitenste gehoorgang is geïndiceerd, heeft het gebruik van een oorzalf de voorkeur boven een oordruppel. Door de hogere viscositeit van de zalf is de kans dat het product het middenoor bereikt minder groot.

De ototoxiciteit van aminoglycosiden treedt voornamelijk op bij parenteraal gebruik en is, bij lokaal gebruik, niet afhankelijk van een intact trommelvlies.

Over het gebruik van dit middel tijdens de dracht zijn geen gegevens beschikbaar.

Toediening en dosering:

De dierenarts dient voor gebruik van deze oorzalf de gehoorgang schoon te spoelen. Gebruikelijke dosering is gedurende 1 week 1 x per dag de gehoorgang opvullen met zalf. Daarna bekijken of langere therapie met neomycine noodzakelijk is.

Wanneer geen antibioticum meer nodig is kan worden overgestapt op een oorzalf met alleen triamcinolon om af te bouwen. In overleg met de dierenarts afbouwen in frequentie (niet in hoeveelheid).

Voor toediening in het oor kunt u gebruik maken van de bijgeleverde canules.

De zalf kan rechtstreeks vanuit de injector toegediend worden in de gehoorgehoorgang. Het gebruik van een canule is meestal niet nodig en is zelfs ongewenst in verband met het risico op het achterblijven van de canule in de gehoorgang. Zie de onderstaande QR code voor een instructie.

Gebruik, als u beide oren moet behandelen, aparte injectoren voor het linker en rechter oor, in verband met mogelijke (her)besmetting.

Bijwerkingen:

Neomycine kan tot overgevoeligheidsreacties leiden. Deze overgevoeligheidsreacties uiten zich in irritaties, zwellingen en rode plekken. Triamcinolonacetonide kan aanleiding geven tot veel drinken en plassen. In een dergelijk geval moet in overleg met de dierenarts de dosering worden verlaagd. Gezien de lokale toepassing komen deze bijwerkingen slechts zeer zelden voor.

Interacties met andere geneesmiddelen:

Wisselwerking met andere geneesmiddelen is niet te verwachten.

Fabrikant:

Dit geneesmiddel is gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities:

Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Na openen is de oorzalf 1 maand houdbaar.

Scan de onderstaande code om instructievideo's te bekijken voor het toedienen van geneesmiddelen bij dieren:

